

METANFETAMINA

Cómo afecta a su bebé



No es buena idea usar drogas durante su embarazo a menos que éstas sean recetadas y controladas por su médico. Cualquier droga que usted toma pasa a través del cordón umbilical hasta el cuerpo de su bebé.

Es especialmente peligroso usar metanfetamina durante su embarazo y puede provocarle a su bebé serias complicaciones de salud a largo plazo.

Si usted usa metanfetamina durante su embarazo, su bebé podría experimentar cualquiera de los siguientes síntomas:

- Nacimiento con bajo peso
- Nacimiento prematuro
- Ataques cardíacos y rasgaduras en el útero
- Defectos de nacimiento
- Llanto incontrolable
- Irritabilidad y desconsuelo
- Convulsiones, temblores y agitación
- Sensibilidad al estímulo
- Daños en el sistema nervioso central
- Dificultad al alimentarse (al chupar/tragar)
- Incremento en el riesgo de apnea en el sueño y Síndrome de Muerte Infantil Súbita (SIDS)
- Incremento en el riesgo de otras enfermedades (VIH, Hepatitis, etc.)
- Retraso en desarrollo y problemas de aprendizaje
- Problemas de comportamiento
- Hiperactividad

Si usted usa metanfetamina durante el embarazo, su bebé

Después de que su bebé haya nacido, él o ella podría tener problemas para establecer un patrón de sueño y dificultad al alimentarse. La metanfetamina puede pasarse a su bebé por medio de la leche materna.

Los bebés que nacen de una madre que haya usado metanfetamina durante su embarazo, tienen una probabilidad de 3.5 mayor de nacer con bajo peso.

- Los bebés que nacen con peso bajo pueden presentar todo tipo de complicaciones de salud incluyendo diabetes Tipo 2
- Los bebés con bajo peso también pueden presentar durante toda su vida dificultades de aprendizaje y problemas de comportamiento, tales como hiperactividad y lapsos cortos de atención.

Es más difícil crear un lazo o apego entre usted y su bebé si usa metanfetaminas durante el embarazo.

La buena noticia es:

¡Nunca es demasiado tarde para dejar la metanfetamina durante su embarazo! No importa que tan avanzado esté su embarazo, es mejor para el desarrollo del cerebro y el cuerpo del bebé si usted deja de usar metanfetamina.



Hable con su médico. Pida ayuda. ¡Comience hoy mismo a vivir sanamente por usted y por su bebé!

©2007 Kansas Methamphetamine Prevention Project

Para preguntas o más información:



Cristi Cain, Kansas Alliance for Drug Endangered Children
Teléfono: (785) 266-8666*
Correo electrónico: ccain@parstopeka.com
Página de Internet:
www.ksmethpreventionproject.org
*Servicios en inglés solamente